



شیر و لبنیات نباید از سبد غذایی مردم حذف شود

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به این که افزایش قیمت لبنیات در کاهش مصرف آن در خانوارهای کم درآمد تأثیرگذار است، گفت: وزارت بهداشت به دولت پیشنهاد داده بارانه روغن و شکر به سمت لبنیات و منابع گوشتی هدایت شود.

وی در ادامه تصریح کرد: ما به دولت هشدار داده ایم که افزایش قیمت می تواند سبب حذف لبنیات از سبد خانوارهای کم درآمد شود. عبداللهی افزود: مصرف زیاد روغن و شکر در کشور ما عامل نرخ بالای بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و چاقی است. / فارس

سلامت و ایمنی غذا

بیماری های مزمن را دست کم نگیرید



دکتر امیرحسین غوبادیپور
بارس انجمن علمی
بهداشت و ایمنی
مواد غذایی ایران

عموماً آموزش رفتارهای بهداشتی صحیح در مورد بیماری های مزمن ارتگذازی کمتری در جامعه دارد. یعنی به رغم عوارض شدید بیماری های مزمن، بعضی ها توجه جدی به پیشگیری ندارند که به برخی از دلایل آن پرداخته می شود.

بیماری های مزمن ارتگذازی کمتری در جامعه دارد. یعنی به رغم عوارض شدید بیماری های مزمن، بعضی ها توجه جدی به پیشگیری ندارند که به برخی از دلایل آن پرداخته می شود.

بیماری های مزمن ارتگذازی کمتری در جامعه دارد. یعنی به رغم عوارض شدید بیماری های مزمن، بعضی ها توجه جدی به پیشگیری ندارند که به برخی از دلایل آن پرداخته می شود.

بیماری های مزمن ارتگذازی کمتری در جامعه دارد. یعنی به رغم عوارض شدید بیماری های مزمن، بعضی ها توجه جدی به پیشگیری ندارند که به برخی از دلایل آن پرداخته می شود.

بیماری های مزمن ارتگذازی کمتری در جامعه دارد. یعنی به رغم عوارض شدید بیماری های مزمن، بعضی ها توجه جدی به پیشگیری ندارند که به برخی از دلایل آن پرداخته می شود.

بیماری های مزمن ارتگذازی کمتری در جامعه دارد. یعنی به رغم عوارض شدید بیماری های مزمن، بعضی ها توجه جدی به پیشگیری ندارند که به برخی از دلایل آن پرداخته می شود.

بیماری های مزمن ارتگذازی کمتری در جامعه دارد. یعنی به رغم عوارض شدید بیماری های مزمن، بعضی ها توجه جدی به پیشگیری ندارند که به برخی از دلایل آن پرداخته می شود.

بیماری های مزمن ارتگذازی کمتری در جامعه دارد. یعنی به رغم عوارض شدید بیماری های مزمن، بعضی ها توجه جدی به پیشگیری ندارند که به برخی از دلایل آن پرداخته می شود.

بیماری های مزمن ارتگذازی کمتری در جامعه دارد. یعنی به رغم عوارض شدید بیماری های مزمن، بعضی ها توجه جدی به پیشگیری ندارند که به برخی از دلایل آن پرداخته می شود.



بارداری پرخطر (ترسناک نیست و فقط نیازمند مراقبت بیشتر است

راه های ایمن سازی «بارداری ناامن»

بارداری تجربه شیرین و در عین حال دشواری برای هر خانم است. دورانی است که مادر و جنین باید تحت نظر متخصص زنان قرار بگیرند و بررسی شوند تا مدت زمان بارداری با حفظ سلامت مادر و فرزندش طی شود. در واقع تولد یک فرزند سالم با حفظ سلامت مادر، پایان خوش یک بارداری ایمن است. اما حفظ سلامت مادر و نوزاد کار بسیار دشواری است و بارداری یک فرزند ۹ ماهه قریباً ۹۰ درصد با خطر مواجه می شود که طی آن پزشک باید جان دو نفر سر و کار دارد. با این حال دسته ای از بارداری ها، پرخطر محسوب می شود که شرایط برای مادر و کودک دشوار می کند اما با پیشرفت علم پزشکی می توان بیماری های مختلف را کنترل کرده تا دوره بارداری را با سلامت کامل پشت سر بگذارد.



پونه شیری
دانش سلامت

همه مادران جوانی که با هزاران امید چشم به بار نوزاد خود هستند، همچنین مادرانی که در آستانه ازدواج و بارداری قرار دارند، قبل از تصمیم به فرزندآوری باید با پزشک خود مشورت و وضعیت سلامت خود را بررسی کنند تا با شناخت بیشتر از بارداری های پرخطر با خیالی آسوده این دوران را بگذرانند.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

بیشتر است. مهم این است که بدانید قرار گرفتن در دسته حاملگی پرخطر به این معنا نیست که مادر یا فرزندش دچار مشکل می شوند بلکه برای کاهش هر نوع خطر به دریافت مراقبت بیشتر نیاز است.

آیا عوامل خطر را خود دارید؟

- هر خانمی پیش از اقدام به بارداری باید عوامل موثر در بروز بارداری پرخطر را بشناسد. برخی از شاخص ها که در انواع حاملگی های پرخطر دخالت دارند عبارتند از:
- سن بالای مادر (معمولاً بیشتر از ۳۵ سال)
- شاخص بدنی بالای ۳۵ یا کمتر از ۱۸/۵
- مادر سابقه سقط مکرر، مرده زایی و زایمان زودرس قلبی
- شیوه زندگی (مصرف سیگار، الکل، استفاده از مخدر)
- سابقه بیماری های قلبی مادر افسار خون بالا، دیابت، بیماری های قلبی، اختلالات تنفسی، صرع، عفونت ها، اختلالات مربوط به لگنی خون دریاها، اپن و هیپانت)
- سابقه جراحی های شکمی قبلی مادر
- چند قلوایی
- سابقه شکمی یا خانوادگی تولد نوزاد با نقص مادرزادی
- عوارض بارداری (رشد نامناسب جنین طی بارداری و جایگزینی نامناسب جنین)

تشخیص به موقع، چگونه؟

- روش های تشخیصی برای بررسی بارداری های پرخطر وجود دارد که عبارتند از:
- مراقبت های بارداری با فواصل کمتر و دقیق تر توسط متخصص
- سونوگرافی های بیشتر در صورت نیاز
- آمیونیوسنتز CVS (نمونه برداری از پرزهای جنینی) و کوردمنتز
- تست های آزمایشگاهی خاص مثل قند خون که بسته به نیاز انجام می شوند.

افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها با خمیر دندان آنتی باکتریال

محققان دانشگاه واشنگتن دریافتند ماده شیمیایی تریکلوسان که به عنوان ماده آنتی باکتریال در خمیر دندان ها مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند اثری معکوس داشته و موجب افزایش مقاومت باکتریایی در برابر آنتی بیوتیک ها شود. تریکلوسان یک ماده پر مصرف در محصولات بهداشتی و مصرفی خانگی است. در این آزمایش یک گروه از سلول های باکتری را قبل از آزمایش در مجاورت تریکلوسان قرار دادند و مشخص شد مقاومت این گروه از باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها در مقایسه با گروه کنترل به میزان ده هزار برابر افزایش یافته است. در حالت طبیعی نرخ بقای باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک یک در میلیون است، اما در این آزمایش پس از ۲۰ ساعت یک چهارم از باکتری ها به حیات خود ادامه دادند. / اپرا

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

بیشتر است. مهم این است که بدانید قرار گرفتن در دسته حاملگی پرخطر به این معنا نیست که مادر یا فرزندش دچار مشکل می شوند بلکه برای کاهش هر نوع خطر به دریافت مراقبت بیشتر نیاز است.

آیا عوامل خطر را خود دارید؟

- هر خانمی پیش از اقدام به بارداری باید عوامل موثر در بروز بارداری پرخطر را بشناسد. برخی از شاخص ها که در انواع حاملگی های پرخطر دخالت دارند عبارتند از:
- سن بالای مادر (معمولاً بیشتر از ۳۵ سال)
- شاخص بدنی بالای ۳۵ یا کمتر از ۱۸/۵
- مادر سابقه سقط مکرر، مرده زایی و زایمان زودرس قلبی
- شیوه زندگی (مصرف سیگار، الکل، استفاده از مخدر)
- سابقه بیماری های قلبی مادر افسار خون بالا، دیابت، بیماری های قلبی، اختلالات تنفسی، صرع، عفونت ها، اختلالات مربوط به لگنی خون دریاها، اپن و هیپانت)
- سابقه جراحی های شکمی قبلی مادر
- چند قلوایی
- سابقه شکمی یا خانوادگی تولد نوزاد با نقص مادرزادی
- عوارض بارداری (رشد نامناسب جنین طی بارداری و جایگزینی نامناسب جنین)

تشخیص به موقع، چگونه؟

- روش های تشخیصی برای بررسی بارداری های پرخطر وجود دارد که عبارتند از:
- مراقبت های بارداری با فواصل کمتر و دقیق تر توسط متخصص
- سونوگرافی های بیشتر در صورت نیاز
- آمیونیوسنتز CVS (نمونه برداری از پرزهای جنینی) و کوردمنتز
- تست های آزمایشگاهی خاص مثل قند خون که بسته به نیاز انجام می شوند.

اعتراقات یک روزنامه نگار چاق

اعتراقات یک روزنامه نگار چاق

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

اعتراقات یک روزنامه نگار چاق

اعتراقات یک روزنامه نگار چاق

- اعتراقات یک روزنامه نگار چاق

اعتراقات یک روزنامه نگار چاق

- اعتراقات یک روزنامه نگار چاق

اعتراقات یک روزنامه نگار چاق

اعتراقات یک روزنامه نگار چاق

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.

Table with 10 columns and 10 rows of numbers, likely a calendar or data table.