

فرآیند نیدل استیک

- فرو رفتن نیدل یا اشیاء نوک تیز در عضوی از بدن
- تماس خون و ترشحات آلوده با بریدگی های باز ، ملتحمه و غشاء مخاطی

- شستشوی ناحیه با آب فراوان و صابون
- خودداری از مالش موضع به خصوص چشم
- شستشوی چشم و غشاء مخاطی با آب فراوان

اطلاع به سوپروایزر شیفت در اسرع وقت

اطلاع به پرستار کنترل عفونت تا یک ساعت

بررسی بیمار و پرسنل

پرسنل

بیمار

آیا پرسنل مورد مواجهه واکسیناسیون انجام شده است؟

بله

خیر

تیتر آنتی بادی بررسی شود و اگر ندارد چک شود

- یک دور ایمونوگلوبولین
- تزریق سه نوبت واکسن
- یک و نیم ماه بعد از نوبت سرم تیتر آنتی بادی چک شود

آیا تیتر آنتی بادی بالای ۱۰ است؟

خیر

بله

مشورت با متخصص عفونی

اقدام خاصی لازم نیست

ارسال نمونه خون بیمار جهت HBS - HIV - HCV

بررسی نتایج آزمایشات

منفی

مثبت

اقدام خاصی لازم نیست

مشورت با متخصص عفونی